
2

B. Chinese



凡病人往往有因嘔後而略覺安然者此醫者所爲參悟其理 而設爲吐藥也但吐藥宜服於乍病之時蓋病初起爲思尙輕 吐藥論

於此服之殆欲其身之津液流行而爲治病之一 吐薬入胃之後原胃之腦筋旣與各臟之腦筋相連而胃則從 肚下之均筋與膈膜抽搐及胃亦隨而斂縮而各處則由是發 而作嘔此所以能合全體發動也 不安面包轉自口津發多未幾作問而全身管覺軟弱此殆由 力然後能將胃內之積物吐出也 若逼之使出此蓋先合其血流行而津液自生多也所 且吐藥服後則心窩頓覺 顧作嘔時而胃與各臟之 助也

門藥思釋

吐藥論

時則面 以各臟或有積血而一經驅後亦能使其舒散又況合各臟 發津液及外皮發表者質欲使血略少並散去血毒也 令各肉筋之力少減 出着先屬食物繼屬酸水終屬苦水而取吐之原委不外如此 个了 出 将或跌打脱離骨級及小腸經氣內筋抽痛取吐之後食筋寬 後所爲殊覺困倦而看看欲睡也 是藥亦能吐出 若論吐劑之妙復有五 四則能斂臟腑血管而止血 先 且間有作嘔而大小便一併出者此取吐之 三則合肝肺生液及肺管化痰外皮發 則胃內或有毒物及有食滯能 五則各物或設入氣喉服 然疾其醒後則病體亦略 二則能平心平腦及 大約所吐 迨嘔

管或成跳血囊者不宜服 芥末以貼胃部亦妙 喉及多 或用級錦衛吐藥均合而究以依畢格為尤佳 服 嘔吐不宜多進食物 片酒或鴉片樟腦酒止嘔抑或用布蘸煖水以鋪胃部或開調 西藥場釋 腹內發熱及小腸疝氣者不宜服 刻或半點鐘久方能吐出然或不應或吐少宜用雞翎探 若小兒十歲以下者服之無礙蓋兒科吐劑或用依畢格 服煖水助嘔不燃則欲吐無物而胃必困苦 至若忌服吐藥亦不 吐藥論 更有服藥之後而運吐不止者宜服鴉 至服鹽類吐藥如飲葡吐鹽等若已足 腦部有病如患頭風等症者不宜 如心經有壞及身內 卽年高氣弱者亦勿 凡服吐藥必 若業經

且吐藥應服若干亦不宜遽作一服須分數次每刻一 救服鴉片毒者雖應比常額略加然亦當小心弗可過服 服之數而服後猶不應即宜改服別種或用草本吐藥尤妙 服爲安

後疲倦恰合寢時也 蓋恐嘔吐太甚故也 銅磺養體提磺蠹及鍁錦衛吐藥是也若草本吐藥厥力稍緩 而惟悶逆殊甚用藥者宜分断焉 服吐藥亦有其候最妙莫如下午蓋吐 要之吐藥之性或急或緩不一 最捷者

鐵筒套護螺絲扭緊筒口將鐵筒放油鐺內熬三點鐘要熱手 阿甫麼啡 **廖**啡也用冷水快手洗過立卽焙乾入樽貯好 其凝結仍以水少許化之再入逾雙炭養後凝結之散乃阿甫 之水加入伊打酒化後加鹽關水數遊凝結又以沸水化之俠 開淡些 一味併入堅厚玻筒內紫翠學及開於是封固筒口外用合式 白度表之一百四五十度為止停冷取出玻筒打開加入 西菜畧釋 灰非精 或口略灰不能結珠若涇時見天氣則變青色 再加入鈉雙炭養胃多和勻俟其散墜底去盡上面 张门 吐藥門 阿前空 濃鹽强水二十份 /清水

水及伊打酒哥囉方俱能化 卷二

カントン ア

溶化 與麼啡及鴉片不同彼能甯睡止痛此則服後抽筋與

皮皆合作問發嘔

服

阿顛那

晰拜

阿

相似甚至頭重眩困之患故或服或節入

用法 復作務將胃內所有盡嘔一 内服可用一 服驗 平人 釐之五份 **每服後五咪呢至二十咪呢則必嘔雖止** 空故小兒服此速見 射入皮可用一樣 、因憊但於 十份

素弱耳 欲絕 論腦部 論身熱雖 初見 不加而呼吸變常初則喘速漸至氣緊 煩躁不久顫動終則痿痺抽筋 僵 厥 不

血

脈無涉吐時脈速止則脈靜其心脈無力者亦綠其

陸との農業の産業力専行於脳行根也

但凡迷蒙不醒大醉中毒一 此吐藥乃近年覈出製法精妙與各等吐藥用意不同 切不能服藥之候及平素最不

效最捷 肯服藥之人遇應吐之症者以此藥開水節射入皮而嘔功 若遇氣管發炎閉塞之症不能不嘔者用此雖能

仏里格 合頑疾盡吐而元神必傷則用者不可不慎也 產南亞美利加巴西麥西等國形如小菜高約

氣 個身之幡於地上者長約二尺采根入藥用根大如鵝翎管外 有以皮而函木質皮外四週均有圓紋澀衣取皮研末色 味苦辛而幣悶 此藥末研無臭研幼則自成臭味

四十二次程

吐藥門

衣服务

真是

一便能作嘔若依畢格則作嘔不甚烈然亦必吐且 大抵該淹微顛不能多服每服一 上 镇师能生产的 文章至于是是人人,一面可容容及以晚九久此物和色纸身。無味不能化珠洁水雄花八酒可容容及以晚 類則能作故應

後葉肆所售者原色略黃而不甚純淨也

釐之四份一

水泡煎反敗其功而且經光 用法取出其功力比依畢 樹根皮內面有淹微

及冷水泡均能提出其功力 種嗅之或氣遊

几

イニオ

並無困苦之累小孩及身弱者皆宜

表篇內

化痰

服法 方劑 一方 治胃弱能嘔瀉 可吐 依畢格末三分 和勻加煖水作一次服能嘔瀉。毎用八釐至 至二十滴若作吐藥大人宜服二五錢小兒宜服二十滴 入無浸七日隨時增動滬淨此酒能化痰發表每服十滴 依畢格根為爛 至六十滴 每服三分至五分開**烤**水一 両分兩三次服每刻 車釐酒二十安 大黃末三分 或用雙蒸酒亦可 一分製

西菜客釋・一人・水

2二 川菜

吐藥門 笛格

1

依畢格末二分

E

水助嘔 媛水調化分三四次每刻一 **患哮喘者當痰作時每服三分至作吐為度若** 服至嘔爲率由是再多飲媛

在平時每朝服八釐連服一兩月庶可獲屋 每日服二四次每服二 咳者赏症乍起每半點鐘服半釐至一釐俟其嘔吐自可 小兒傷風氣緊而致咳者亦服之良 三釐亦佳 彼肺內皮發炎而致 八 思 咳 症

去痰止咳

內傷將此藥或調水或作丸服之均妙 若春秋二季作瘧及思熱症當初起時宜 胃不消化毎朝 西藥界釋一人於二 農依畢格水二錢 先服此藥取吐吐後再服金鷄納霜如此則該症自見 濃毛地黃水二錢 起以此療之屢試屢驗 仍有嘔俟過十 患紅痢者宜先服鴉片酒養 次服此藥三分服後或 和勻每服三十滴至六十滴每三 爲度濃依畢格水製法詳下文第 痢症每朝空心服 可止吐血鼻血及婦人經水太多 吐藥門 低器 野素 一點鐘再服至不作驅爲度凡紅駒初 一產晚間另服些鴉片酒甚效 濃了葛水四錢 製法不得妄為增减另詳以上各藥水濃淡均有一定 四點鐘 卷 一服以血止

路卑利 此葉產自美國俗名土煙蓋因其人口與煙葉同烈 名二

故名之耳而實非煙類也該樹高約尺許有壳內包數核美國 田間類多叢生不須栽種大抵葉殼均堪入藥宜研末切作散 服後頓覺昏俗沉悶恍如吸煙致悶一般故此不宜過

服功 服過服能壞人蓋因其性酷烈恐致嘔吐非常 取吐每服八釐至分牛 若用以化痰治痢每臟葉末

方劑 作藥酒方 此酒取吐去煐可治喂喘二釐或四釐每日 四服

將淡火酒十五安士浸路卑利兩日用漏斗隔出意路卑利二両 淡火酒具小各半便是

得回原酒二十安士爲度如不足加些淡酒添足 **樽餘酒五安土亦全傾入樽內楂畫藥內之酒再濾隔要 上痰**每服十滴至 一一滴

芥末

形色

氣味

略減黑者一種尤為辛辣

此 西國分黑白

物中國西國皆有之

眼喘毎服十五滴至五分每兩三點鐘

服

四一

治

服功

取吐服四錢

未研無味研細則色其而味苦辛以法撵去其油苦辣 一種黑者有油白者則否

四樂器釋 服至 胃不消化每服三分日三服 錢即能作嘔

功用

藥性

吐藥門 茶未 鉄館散散

誤服鴉片者用此救

級鐵葡吐散 方劑 鐺內約煎一 錨復煎去三分之二取起俟再結隨將前後珠和 先將錦葡 汽水三十两雨 頗驗並能引炎詳下交卷 芥末四錢 同煎服能調胃每日 二散以少水研和如漿貯十二時人加入餘水同紙 刻煩攪之濾淨取水俟冷凝珠將珠取出餘水人 製法 牛奶半斤 四服每服 銀葡酸散四両四錢六分二 篇 茶益

由是用軟紙提去水涇即是藥也

形色 此珠無色而體有核芒能過光露天氣則水耗散其珠

氣味 變爲不能過光之白散

味辛而澀悶以水化之則無味小兒易服

溶化 化些須惟火酒全不能化 冷水十五倍可化一沸水 雨 但以水化此藥久則恐變壞惟 三倍能化一卽常酒亦能

加火酒五分之一則無此弊

功用 服法 三次或兩次服 發表化疾每一釐分十次至三次服 能止瀉發表散痰散熱平脈外敷亦能起粒的炎 作吐藥每服可用二 平脈每 釐

西藥畧釋 //於 吐藥門 級競電散

相反 方齊 養氣鉛霜 清水五両 清水四両 攪和分四次服每刻 **耿錦衛吐散五**整 助嘔惟當胃部發炎則忌服也 鉄錦葡吐散 酸類 能合吐瀉熱症宜之 蛤利類 沒石子酒 取吐用 **建**四 蛤利合炭養酸所成之鹽 服若既吐即停服由是多飲暖水 及醋斂藥 和勻每點鐘服八 鎂磺素八錢 白糖 錢

一十 します

又 方 嘔吐發表

和勻分四次沸水開服每一刻服一次銀錦衛吐散二釐半 依畢格散二分

和与分四次沸水開服每一刻服一次

些須,合患者卽行作吐而身體略爲軟弱由是醫者卽張 此時而用力送回原骨之位可也 重不寐服他藥而弗應者宜服此藥若服後腹痛而致嘔 打脫離骨銨在患者力大患痛不能送還原位可服此藥 凡脈浮身熱口乾頭 跃

西藥畧釋 吐大甚可服鴉片散或鴉片酒及甘菊花各潤物解之 ,孕婦及虛弱之輩忌用此藥且凡有小腸疝氣腦內 八七二 吐藥門 鉄鐵衛時散

藥酒一方 叉 沸水十二两 方 **欽錦葡吐散** 一錢 方 積血心經有壞及吐血等症者皆不宜用蓋其功力過益 吐後速弱也 欽強衛吐散工營 **欽娣葡吐散**五釐至 和化後加入車喱酒士量安 治風涇 解鴉片毒 丙傷咳嗽嫁胸前亦妥 和匀擦之 開服取吐 樟腦酒四錢 沸水一安 調勻

叉藥酒方 欽錦南 吐散 五分 沸水十三安

方論

和化後加入火酒三安士量 此藥酒在西國最為通行

小兒取吐多用之每服三

若大人服之亦能

化痰發表服此藥後能合體軟脈沉而功力較依畢格尤 十滴至六十滴每刻一服至吐爲度

烈彼孕婦分娩時其子宮口倘若難開則宜服少許合其 作問俾子宮口易開庶無難產之患但不宜過服過服能

壤人

療肺內炎症

吐藥門 級錦南監散 雄雄素

程確聽 清水四十八両 握質擇熬者 釐照此連服數天而肺內炎症可愈此乃平脈及去肺炎 此藥二釐連服三四次然後加至每兩點鐘服三釐或四 和勻分十二次服每點鐘服一次以一日服畢爲度但初 之法也 服時不免嘔吐惟斯多自不致嘔 級銷葡吐散一分或 化痰酸表另詳下文第 **建炭產四錢** 磺養酸十二安 清水五安土 叉法每兩點鐘先服 篇化痰門

綠氣水足用

煙熱合其化盡濾淨入一可裝八磅之樽逐少加入綠氣水不 先將趕質放磁盆內次將磺養酸和清水併歸 處溶化輕

住手撒与加至間絲氣之臭為度續加鍵炭養至起黃鹽俟黃 瞭墜底再濾隔煎至上面起一層薄衣停冷凝珠以紙鋪新瓦

上或嫩火階磚上以收乾其水氣即是藥也妙之製法也 去而變為白散八藥宜 該珠無色過光形狀略如鎂磺養露置則水略化氣散

倍自可化 且此物火煅可熔蓋原面之水受熱即能

西藥界釋

吐藥門 鑑着

火酒不能溶冷水用雨倍半方能化一若沸水則不須

味澀不可口

方劑 相反 功用 服法 经磺煮-超磺養二分 內篇 之臨凡屬植物之鍁藥 自化已質也 蛤利類 每服分半至三分半必吐不甚問苦 作吐劑 搽金錢癬 作丹用能見下文引 一錢 蛤利合炭養酸 **救鴉片煙及誤服毒物** 作補劑詳見下女 請水化開每刻 石灰水 服嘔出效 銀質鉛質所騰 作飲齊文飲劑

| 薬化署冷 | | 浸化滬淨煎去水俟凝珠即此藥也 | 紅銅片或 | 俗名製法 | 樹膠末五分 清水二十安 和勻搽之 | 超 磺 | マ 方 | 和塗甚效 |
|------|--|----------------|------|------|------------------|-----|-----|------|
|------|--|----------------|------|------|------------------|-----|-----|------|

煅之則本體之水足化已質煅入則焦枯

藥性

與鉄錦衛吐散不同彼服後吐則身體軟弱服此後雖

吐而不甚覺也 又與遲磺蠹相仿略猛烈些吐劑中各

概而論也

有分别處細核自明不可 作吐劑可服八釐至一

作丹用

分四釐

功用

門第

作飲劑其見下

詳見下文引症外出門

蛤利合成炭養酸 硼砂

石綠 鉱葡鹽

相反

蛤利類

鉛霜

銀淡養

凡屬植物之飲藥

救誤服鴉片及毒物等

方劑

藥性 纸纸 功用 溶化 西相藥反 氣形 际色 銅磺素二 磺四 薬篇内 服 者學物階卷二 服法 與銅磺養同 色 蓊 熱水易化冷水亦 一白礬 白味澀而甘 多飲煖水以助之 原成炭 分分 此物產於火山及出煤等處另有用法 作吐劑每服 和 吐藥門 白糖調水服每刻服 可惟火酒祇能化少許 石灰水 纸纸莲香 錢糖水開 鉱養 鉱 葡 鹽 作歛劑詳 吐 鮨燐

方劑 白礬末 養 嘔 日未驗次日再服 鉛霜、素質之鹽 治小兒肺炎暇喘 凹錢 二錢 救服鴉片各毒物 開糖水服每日服二三次至嘔爲度倘 開糖水服未吐再服服後多飲煖水助 加匿酸 **%石子水**

利小便者乃合便溺逾常也夫溺少有數端 若小便非由濾隔而出將必致病於此宜服利水劑令雜質由 面之雄質每日夜亦納有一両九錢 在冬天則每日夜約有二觔至尿中所 病愈則小便自通利也 腑血積而不運動更或身體發出各種熱症與大作瀉及發表 雖 因溺管生窄溺管內生內瘤 西山 有雜質大抵雜質或屬生物或屬砂類不一蓋羅病者茶便所最 服利小便劑亦終罔濟而且或內腎有壞而血不運行或職 皆能合溺稀少如此亦無庸服是藥而當用别藥療之俟 此蓋由內腎出入之血所濾隔而成者也 肉瘤而該溺欲入膀胱竟爲所阻 乃若內腎所發之溺其中則有水及 因膀胱無力一 此以則

西藥罗釋

利小便論

質發出 血濾出庶免病生 能療膀胱及溺管所患之症 陽面有雜質而未發出者宜服鹽類之品 解熱症 而 溺之雜質概行發出而免成冰症 小便少者令其生多 把松節油 水佐之勿合發表勿寫大便誠以汗瀉與利水宛 不能合雜質發多惟屬鹽類及清水者 其在患水臌者宜服植物之劑 及斑盔等類者服後則該藥能與粥同入膀胱而並 四 可除腹臌之 利小便藥如屬植物者則能合水生多 ノの肢腫脱地対 血有毒物合內腎提之而出 蓋服利小便劑其妙有五 凡欲利水服藥後宜多飲 方能合溺所 五則 其在 且利 **合化**關多及合 熱症瘧症及 水劑如哥拜 反 面之雜 也 二能

功用 方劑 遊蘭酸散 再服也 調每日數服 藥瀉臌是由大便瀉水此則由小便而消臌也但服 以消臌無一朝一夕之功而連服五六日後卽宜隔 連服數日可應者亦或有連服數旬而始應者若用此聽 級葡酸散二錢 和勻分數次服 製法形色已詳上 利小便退熱每服二分半至 臌症足腫小便短者服之良 利小便門 城前數数 級藍鹽 牛奶十二两 / 瀉薬門第 錢宜以多水開 篇内

飯醋鹽 變作無酸為度爐淨放入玻釜坐沙釜之上隔水炖熬去盡水 將紙雙炭養由漸投入醋强酸之內至無炭養氣發出而醋强 汽便可製成但熬此藥最宜小心不然則玻金與·藥均能致壞 新梅樣皮四錢 **醋虽酸十二两** 紙葡酸散 淨白摩之恍若有油倘若露置則能吸天空之溼汽而 療水臌利小便 製法 **浸泡分一二日服均处** 四錢 冰花糖三両 沸水二斤

氣味 服法 功用 化水其形狀若油故宜以玻樽貯密 因肝病面黃而致者服之最效 新醋鹽二分至 加別種利小便藥同服以助其 能合尿酸多兔成冰利小便消水臌 鹹 各酸類 每服二分至四分多水調化每日數服 而幸 治皮膚人患水 始 磺 養 治少年病後足腫腹臌 多水調化分雨次服胎後數 利 啦 小便門 鎂磺養 癩、 鱗癬別藥罔效 一级灰養 但水臌

纸醋鹽五分 每日三服連服一二月自效

冷水備足

桐離火頻頻攪之疑珠則幼然猶未甚淨也有 物同重浸兩日隨時攪動濾去不化之雜鹽取淨水下鍋煎 **欽雙炭養十二安士** 上等鹼沙磺强水即沸者是 汽水十二安

極淨製法

鍋煎去水氣略稠離人用薄鐵片攪至結珠為度入樽貯密 紅色付耐牛點鐘之人停火俟冷盡入汽水化開後濾隔入鐵 以欽雙炭養全放入鐵鍋內慢火煙熱煎去本身之水迨煅至

淨白倘露置卽荤吸天氣中之水汽而化盡頗似

黄而舀清

氣味 水能化投入的沸田放也、 溶化 水一化一

火酒不能化

各强

服法 每服二分至五分多水調化

功用 佳最 利小便 消臌 凡因心體有壞內腎有壞初起水臌 解酸

解酸篇为 第

徑酒風腳肝舊炎等症均效〇又凡吸核因舊炎而**堕**

+

通冰弱有紅碎

者及風

西藥思釋 各酸類 鎂碼蠢 有酸味之各鹽類 利小便門 級錦蘭吐鹽 轄淡綠 迦路米 石灰水 鐵磺養

相反

臟

炎腫或積明汁生實者服此可消

| 新炭養三錢或 清水十二丙 攪勻洗之 | 新 一 方 治 所 症 力 服 外 塗 調 引 全 患 虚 一 大 に の に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 | 和勻作沸隨卽服之 | | | 欽炭養四釐 | 止淋痛 | 趕磺蠢 桂拏磺穒 鉛霜 銀丹 | 7- |
|-------------------------|---|----------|---------|--|-------|-----|----------------|----|
|-------------------------|---|----------|---------|--|-------|-----|----------------|----|

清水七斤

欽炭養三十八

和化復由雲石於用法取

炭養而加入飯炭養水之內至不能食爲度爐淨煎去水限以 是薬 百度表之七十 形色 一分水汽盡取出冷卽疑珠紙提去水煙便成 無色過光露置不潮

氣味

略鹹

功用 水四分化一火酒不能化 利小便及可療各症略同紙炭養

毎服照鉱炭養倍用方合

服法

利小便門 級塩鹽 軽淡醋鹽水

跡梅鹽

製法形色氣味功用已詳下交卷

發表篇內矣

西菜思釋

級梅鹽水 服法 輕淡醋鹽水 梅檬珠 輕炭養即一 両零七分 **月**艮 和勻爐淨後再加清水要足十六安土為度貯玻 和勻爐淨每用四錢加水服之功用發表利小便選 樽貯清水十二安土加入醋强酸 加甜硝伊打酒三十滴為妙 發表利小便傷風喉痛初起麻痘初起服之具口 用時每樽取二錢或四錢和勻加清水服之 四鐵 欽雙炭養五錢 清水十二安 清水八安 四安士

症身弱者可服舌乾譫語服之止渴退熱 O婦人 之能消散平復 水少頃即清醒〇外治凡跌打骨錠痛頭應毒瘡初起擦 問發嘔每一點鐘服 一錢可止頭痛○酒醉後飲此藥 一頭痛作

標咕 樹產亞非利

形色

白

凝結成珠似樟腦

能飛之油質功力卽在油恍似薄荷油以輕火焙煖油可

服法

西藥署釋

釋 一人 利小便門 標浸水或浸酒用每服四錢至一両

功用 人嘔瀉 消化之力利小便長過平日且溺內有藥油之味大服令 皮發炎小服見效用葉三分半至五分 能助腹中之暖以行週身如飲酒微醉小服能開胃助 凡內腎內皮發炎 膀胱內皮發炎 溺管內

方劑

標咕葉二錢

蓋密浸半點鐘隔淨用每服四錢至

両

方

要巴兒些葉二錢

熱水十六安

標咕葉八錢 蓋密浸雨幣鐘隔淨每服八錢至 滚水十六安

両功效同上

哥枝烘 圓 哥枝噤 根或 轉苦辛核味苦辣 高約于

一寸根長徑約

略

產歐洲

國

氣味

略甘漸

於死 佳, 薬性 服功 **注用** 小 有毒多服每至嘔血大瀉弱極

一用核

均妙浸酒以核尤

薬

或

用

困憊

難

堪

以 致

服令人 用 每服 多發津 釐至 七釐過此 液 作問利 則或 大小便發表 心嘔或瀉 平脈

藥酒方 利小 便 利小便門 用

方劑

止痛

利小便

研 末

不塡

方論 又 日三服 以車釐酒十五安土浸藥七日將餘酒加入隔淨揸盡藥 藥酒皆然每服十五滴至三十滴 方 倣照上文卷 哥枝紫根兩安半 内之酒以足二十安士爲度利小便每服十滴至十六滴 哥枝噤根四安 走風脚症初起及少壯者宜服若久患及老弱者不宜 此方療走風腳症西國最為通行惟當順用者有七 治風涇走風腳 車釐酒二十岁 火酒二量 篇內路卑利酒製法几用火酒作 一十安

松節油 以刀砍松樹新流出未經日晒之松脂入大銅甑蒸之隨時加 水 西藥累釋 極淨製法 甑成油輕必浮水面所賸渣是松香取出油貯以木 松節油 七凡用此醫者最宜小心倘有室礙卽宜改換別藥也 **计略多小便略多外皮發表大便頗少如此則服之宜** 五服後倘若作問或嘔或瀉不宜再服 製法 三初服宜少以漸加多可也 乍起是症宜先服別種瀉藥以利大便而後 一十安 利小便門 清水八十岁 四 不宜偕別藥同服 六服後覺膽 可服 桶

併入大銅甑內小心慢火甑之甑至管器不見油出魚度或加

欽養八油內撒之可合食盡油內微洋焉

煙濃黑若受熱至百度表之一百五十七分卽作沸若露 清白而豔質稀如水比水略輕能化氣飛散火燃即焚

置能吸天氣而略稠一變黃色內有還原爲松香者蓋松 節油本炭輕三質合成非油非水也追吸養氣則漸壞矣

氣味 各類油和勻相冷叉能化松香之類及牲畜油膏樹膠等 苦辣其臭辛香自成一種氣味 水能溶化些少火酒伊打酒能化略多

但此油了

可與

利小便每服八滴至三十滴每日二三服 熱症出強

功用 方劑 內腎矣 引炎外出均詳下文 服 以擦外皮而小便即有藥味是知此油必先入血而後 內略煖脈略快呼吸小便均有此藥氣息卽嗅其氣或用 語與夫腹有微痛及略有氣臌等弊者宜服 射出均宜服 約經十餘日每服十滴至十五滴每日兩三服但 久服恐合內腎發炎有溺血之患用者宜知 利 小便 治日久白痴舌乾滑大小腸有氣大 熱症出無約經十餘日身弱脈數舌乾譜 一行血 利小便門 溺不能忍或膀胱孱弱不能將溺 殺蟲 去胃腸之風 凡服後腹

又 又 清水半安土 鴉片酒二錢 雞蛋一箇 方 松節油 如口 出皆身弱所致服此可止 松節油二錢至 彈上帶属血等狀服之皆效紅痢數日後略 治吐血鼻血肺血胃血大小腸膀胱流血由 一篇 稀粥水八安士至 作一次用 氣臌大便祕結用此節射入肛門甚妙 錢 和勻毎服一 樹膠水五錢 杏仁油星安士 毛地黄水 范麻油属安土 錢每三五點鐘 錢 樹膠水四 大小便 錢 可服

薄荷水 松節油 松節油五滴至 松節油二錢至 方 妙竟其耑走內腎致有傷也 雞蛋黃或樹膠攪勻服之照方多服服後兼服葬 至大腸內扁節蟲長約五丈有前詳宜用此油 胃不消化腹脹腹中有風俗名氣臌口苦面黃 殺大腸小蟲 治耳聾乾枯無耳糠者 战 生油或甘 和 利 匀每 小便門 作 作 次服 次服氣臌腹脹尤妙 三點鐘服 各半和勻滴入耳內 松節油 錢、 麻 両 油爲 和生

| 垢穢臭腐解毒生肌 | 松節油不拘剪去黑色爛肉以綿花或較一 方 頻治爛肉 | 節油五兩傷 | 松節油二嶺 生油一両和匀擦之 | 一方 擦風溼跌打骨痛及腳 |
|-----------------|--------------------------|------------|----------------|--------------|
| | 刈以綿花或載布准捲聽處 | 一一研和沙紙開點甚驗 | 樟腦二錢 醋强酸二碳 | 樟腦油一安 輕淡水一錢 |

外治氣臌方 點於布上 鋪 腹內有炎及氣臌以熱水布扭乾滴 腹部覺痛熱卽撤 去不宜過久也

油

哥拜把

形色 取機入藥用 鮮者清如水久

へ 則 變 黄 下

而

力斫樹身

此樹產

南亞美利

氣味 生油其質比水略輕 稠藥肆所售者稠 苦辛不甘 而清或略黃如

打 利 火 小便門 酒及生油 均能化合

水不能溶性

伊

服法 功用 方劑 評訂 清水三酸 哥拜把二錢 服後 形面其類於內以便吞服 水 故過服則或嘔或寫或大腸痛或小便痛及溺中有 利 桂皮水冲服西醫以是藥艱於入 每服二十滴至一錢每日三服用白糖或蛋黃及薄荷 藥性頗熱服後喉腹略煖該藥力由各臟內皮而發且 小便治內皮炎症白濁白帶寫痢血痢 呼出之氣及小便皆另具一種氣息間或皮發 分二 樹膠水六錢 甜硝伊打酒二錢 和勻每服 口因用樹膠作 战战 紅疹 血 三服 欖

THE WAY

りてく日本自共中以及市

若將哥拜把幾用法甑取淨油棄卻膠物蓋霧哥母次服十滴 至三十滴更妙 白帶每日服二十五滴 內皮多生痰者老人咳症服之尤生 身有熱者不宜服 凡白濁女人白冰白帶吸咳肺

又九方

哥拜把油一錢 畢澄茄一錢 松節油一錢

鉄養散

甜稍伊打酒

二錢

共。和勻作九六十粒每服三五九能療各定

幽淡霞四両 磺强水四安

火酒三十二

先將鏀淡養人甑後將火酒磺强相和加入如法甑取得一 利小便門醋解對酒

先將器貯火酒二十安士以磺香酸三安华逐漸加入酒內僕 十度而曲尺盡處之圓濶玻器煙時須以冰雪凍物護之侯該 人煙熱玻管曲尺圓柄但極宜小心煙至熱足寒暑表一百八 冷後注入曲尺玻管乃盡將銅線投入再以硝强水四安士加 五安士爲度 玻器內所接得之酒到十三安士限度即可停火叉俟曲尺之 前發火煙熱至玻器內再收得酒兩安土連前共收得十五安 上圓柄已吟將所賸硝强水半安土再放入曲尺玻管內復如 士矣將騰下之火酒九十二尝士和与即胡稍伊打酒也 稍强水四安濃火酒二安士量磺養酸土生幼銅線六錢 叉新製法

收貯 色白而香味辛甜臭同伊打酒

遇人則焚見光則化氣形散收藏在黑暗處為安 玻樽要每個可裝八安士者配合上好玻框以免洩氣

貯日人欲覈其有酸否以草藍紙拖之略變紅則知有酸

倘收

服法 但稍有仍不妨 利小便每服四十滴至八十滴或和醋强飯或和飯錦

葡吐散或欽炭養或和毛地黃水同服均妙服時須

調和乃可

合身體煖和倘膀胱發炎或有砂小便淋遞作痛或內腎 利小便解熱發表止悶去腹中風氣形寒惡冷服之可 利小便門黑游

、溺痛服之均效



畢隆茄 拉巴等處今廣州亦有之 此藥產海南諸境加

函有油榨出其油清而無色

種二

類

附甑油法

氣味

辛温無毒內

蒂面有圓硬白仁蓋與胡椒

結果實狀如桐子而微

附樹蔓生春開白花夏

畢澄茄不

一分冊末療白濁每次服一分半

服功法用

利

小便毎服一

清水足用

甑油用之可療各症

方劑 薬酒方 畢澄茄哥两 治白帶每次服藥末一錢日三服 藥酒能祛腹內之風每服三十滴 畢澄茄油+滴至 每次宜服此藥末二分至三分日三服 每日三服俟白濁將止以漸減少可也需應蛋繁奇服點 同浸至製法已詳上支卷 小杯 一方 利小便白濁 利小便門 主 淡火酒二十安 白糖和服漸次加多至三十滴可也 路卑利酒篇宜仿照之 膀胱內皮發炎日本 **外患白濁每次** 一組服 此



服法 便外吐也惟不宜多服多服則恐吐瀉異常 利小便治水臌化痰其化痰之功力乃冷痰稀而多以 利小便宜服 一釐至五釐

功用

當脈數身熱時不宜服熱

方劑 西藥界釋 此藥塗在皮膚能起紅片如漆食此亦不可不知也 方 方 士圭釐末每服三釐四至一 士圭釐末 和匀作 和与每服三分半至五分 原水臌 化疾 此藥產歐州之西邊南邊美國英國等處富東聲 一幢 包 钱 利小便 次服毎日三四服 利小便門金琵 飯前酸故九錢 **蒙監九** 分每日四五服甚效

慶岡宿皆有鄉人取以為帚枝稍花蕊極繁黃色如雀嘴故名

樹高三五尺不等取嫩枝入藥

氣味 苦澀不可口花味亦苦均可入藥

以利小便從無用作吐瀉藥者 服法 大服作嘔吐大水瀉小服利小便然此藥專用

至五分可利小便

嫩枝研末每服一

金雀花城村零四両新鮮 利小便消水臌

火酒足用

方劑

先將此嫩枝八石白內搗爛盡搾出其汁每汁三分加 火酒一分和匀放下上 七日然後隔淨 八樽收貯在



图 補劔利小便不致過甚凡身弱膀胱舊炎內皮發津液 酸及加播匿酸 藥性平和

分二

NE NE

多尿有潺者用之良

功用

每服用乾葉一分七釐至五分

服法

要巴見些葉四錢 利小便 沸水十安

柏子

MIN

浸兩點鐘隔淨每服安半至三安士日三服 柏子西等 國各處皆有樹高八九尺至丈餘子結紫 此樹產於歐洲英國美國即中

黑色內包核三顆采嫩枝及了

氣味 方劑 柏子作爛 柏子四錢 柏子四錢 每目三服 苦辛而香頗類松節油 利小便治膀胱舊炎療白濁病後臌脹或水蓄 治臌脹 泡浸兩點鐘 凡毒瘡初腫未潰者以柏子搗爛和別藥塗之良 麥糠八兩 **欽葡酸散四錢** 沸水二 土量安 利小便門 學藩女 日內分數次服完 泡浸兩點鐘 沸水二十安 煮餬乘熱剪

蒲公英 形色 四分至八分宋根入藥用 功用 柏油 消惡腫結核、 平無毒主治婦人 氣味 和勻煙熱可塗治久患皮膚等症 利大小便胃不消化肝積血大便結服此均效 產歐洲美國等處卽中國皆有根長六寸至尺 先以柏木甑油如甑取把嗎油之法 八錢 根汁如牛乳味苦無臭 綿羊油 治胃不消化等患極效 丁腫蛇螫腫痛未知是否果有此功力也 、乳癰煮汁飲及封之立消解毒散滞 二一錢 猪油二 考訂 按本草云甘 餘橫

毛地黄 煎沸至一刻之久隔淨隔時再加些沸水收足一 蒲公英八錢切 爲度每服安半至三安土 清水二十安 有霜具大功力用法取出西土 毛地黄海塘 氣味 呼為地治低連者卽此物 高三五尺其花似鐘而色紫葉 長約五寸澗約二 霜似粉略黄 頗苦無自 此樹產歐洲 一寸有奇葉面 也

利小便門 玉醬

能療心症凡因心經有壞而致血不流行眼蓋略腫血色 發紅脈數氣緊服此均妙水臌服此以利小便亦 火酒可化伊打酒與水不能化 利小便 名二 一不服詳下文卷 十篇內 第

發表論

發表者即合發汗也顧人當無病亦時有汗生惟汗少則不覺 汗此亦不可不知也况所出之汗不一有由血中而發出鹽類 酒或吃熱茶或多擁衣食亦能令其體煖及血速行而輒易發 有三動之多者是蓋經細覈而始知之也他如無病者或飲醇 在夏天則多而在冬天則寡大概夏天毎日夜其多者約出有 而汗多乃始覺耳蓋皮所發之汗及肺所出之水汽臺霧時間其 出於不覺者也若當勞動之餘而汗則不止此西國醫士嘗考 三觔十二両冬天毎日夜其少者約出有一觔四両然此尚屬 一人夏日操作不過約一點鐘其發汗竟至有二觔之多或更

八台二

. 發表論

表可也 身軟力緩而此時汗管自易引水而出 表乃合汗管發力及令血流行大抵服是藥者 熱則皮乾而汗少是非表之不可此發表之劑所由設也蓋發 者亦有由血中而發出雜質者醫者概宜察及 腑服此則能令血散而行於外皮 寫劑俾熱少減然後可服此藥服後則兼食解熱等物以佐發 之能合熱悉除 引病外出 因之而少 一熱症初起服之能合熱遽散 內腎或不發溺服表藥則能合汗多發而粥自 惟當熱症盛發之時不宜遽服須先服涼劑 內腑生炎服表藥亦能 因外感而血精病 熱症將退服 一合作問則



排魯加偏豐波藥性 峻猛蛤利類專理臟腑功用和酸類可

服法 每服一釐之二十份一或三份一 亦作鹽結珠 溶化 水能化硝强酸和之尤妙

亦可用節射入皮

服功縣無 涕淚皆多兼水瀉心跳加而脈虛無力藥行兩點半鐘汗 後身凉熱必減低寒暑針 大表行血服後約十咪呢其面耳及頸皆紅熱大汗涎 小兒服後各情狀較輕惟汗後困倦則同面色先紅 一兩度約三兩個時辰乃能復

後白汗時惡寒後必軟弱其藥力本非入腦蓋因寫後血 也眼瞳人縮小不流動約點半鐘乃可復元

相反 主治 喘皆效 察其水瀉情狀可知能助各臟腑發力且能合尿底隨汗 服後問嘔空腹尤甚近經察確惟服蛤利類之後乃如是 可治嘗見服後 而出然小便如常綠此藥祇能表寫不滲利膀胱水道 草烏頭 凡臌積肺膜積水血多尿底新舊風涇統膜發炎致哮 婦人產後乏乳服之可通小便有糖或無味或頻多皆 五金鹽類 此藥能合血脈腦筋散緩故心跳脈虛促身候減低 並治皮膚疗毒能拔血內之毒由汗管而出 綠匪鏬稔 最忌者鐵 日內減去尿一百數十安士者 發表門 排魚偏 欽梅鹽 顛茄子 蔗先稔 也

鉱梅鹽 製法 清水十六安 欽雙炭養士里安

名二

梅檬酸珠十安

先將檸檬酸珠與清水和勻後將歐雙炭養漸次加入至無氣

出爲度爐淨煎去該水煎至上面起一

層薄皮火宜收慢不住

手欖勻俾易凝珠珠旣凝先將一瓦確焙熱放珠入內少頃然

味鹹略苦

後取出細研為末隨用玻樽貯密

將欽雙炭養逐漸加入 水可化火酒不能化 梅蒙十八安

法

溶化

形色

氣味

此乃白散也露置即潮

級雙炭養備足

、棒様汁中亦加至無炭養氣發出

形色 將輕淡炭養漸次放入淡醋强中至沸定而無氣出為度 輕淡醋水 方劑 然後德淨照上 服之良效 次醋强酸宝十二 鉱 梅 鹽 与每服 發表利小便 此水頗清無色 製法 一一錢 法製就收貯 發表解熱 酒杯每兩點鐘 清水六量 發表門 服法 氣味 輕淡炭素備足 軽災酷が 毎服三 梅檬油 味鹹而甜無臭惟不能 服 一錢 白糖

須隨作隨用 發表解肌熱解醉搽跌打傷消頸應骨鉸腫有水

主治 功用 凡身熱皮乾作渴者宜服每服一 喉痛傷風及身有微熱服此 一錢至六錢和白

加糖冲

可治 時亦不妨服 水服熱症服之即能發表 風涇淺症服之亦妙 小兒出麻遲慢宜服此以助其出若麻出

若發炎及患大熱症初起

旋收亦宜服之令其再發 能解倘或服後作嘔即宜少停方可再服 者服之均驗 婦人頭痛作悶每服一 且出麻後或腳腫致成水臌

一酒杯

酒醉服フ

結鹽為度此際再加入水四倍熟該条則解計图再煎至沸後以 提法 沸其鐺底不能溶化者卽生鹽也用法將鹽提出再煎至底不 化濾隔而成者也 牛皮膠水投之待牛皮膠水粘去污坭乃納諸淺銅盤中復以 清水四酸 華淡醋水二銭 用此塗之亦能散 火硝三錢 治跌打被傷前方搽之 此物多由地採掘產印度秘魯埃及等國蓋以水 沸水八錢 但覈原身多面生鹽須提淨始堪入藥 和勻每服一両二錢每日二三服 發表門欽養 甜硝伊打酒 骨較腫兩有水及患頭癌者 同煎沸後加以少水復行前 錢 鉄鐵葡吐

根旗攪之一 則欲其快凍而易凝珠 則攪動凝珠幼小便於

出水涇則極淨也 浸洗約數點鐘乃開盤底各眼使爐去泥水仍開頭由是用 取用也凝珠既定將珠放於多眼木盤內盤繁隨加清水將珠 珠色白味苦而涼此硝 紙提 珠

露天氣不甚發潮蓋原未面水也

形色

氣味

綠沸水能以少化多故用鴻水即可提出食鹽提淨矚答 冷水四五倍方能化一沸水小半分包三分即能化

溶化

功用 以硫炭則可成上品火藥 服法

錢祇用清水些少化服能合慶內發炎而傷內臟若以 利小便發表 水少調服則能壞人如火

方劑 淨硝四両 淨确三釐分 薬水敷之 查時珍本草暨醫方集解朴硝鹹苦性寒能破積消帶合 大黃則寫胃腸之閉結合柴胡亦能發表提淨者名芒硝 一角化服即可發表退熱 退熱用三分半至五分服後能合脈平而心力少緩 解腦熱瘡炎及風徑骨鋑痛等症 和勻每服一安士日三服 利小便 輕淡綠 甜硝伊打酒 發表門級瓷 ·四両 清水一二 錢 利小便每服三分坐至九 金雀花水出安

清水十両 淨火硝二錢 淨火硝七釐分 淨火硝四分 約七歲而遺尿者每日服二 錢 發表用 治熱症 發表甚驗 和与分四服每隔兩三點鐘 甜硝伊打酒酒十 和与每服二小杯每 清水 鉄銭葡吐散一 鉱 凡 肺內皮有熱及喉症初起者甚驗 錦葡吐散 錢両 和化作一 級錦蘭吐散水海五 二釐 釐 點鐘 服 迎路米二產 樟腦鴉片酒二 次服毎日兩服 服 小兒年 二一錢両 白糖

M

至若以火硝酸肉其色亦鮮而可經久

鴉片表散 製法

鴉片末

主治

服法

發表服一分半至二分

止寫每服八釐至

發表止瀉止痛其功力卽在衣畢格及鴉片末也

分七釐每日三服

止咳每服四五釐

小兒肚痛每服坐釐

和勻研極細末

衣畢格末

鉄磺養八錢

風溼等症服此能發表止痛 各部發炎須泰酌而

用但此散除發表外祗作鴉片用耳 形色氣味功用已詳上文吐藥篇內茲祗論其 發美門 鴉左表散 衣里格 飯鍋南土散一三

之功用而已 欽錦南吐散 服服後須飲熱茶及擁被以助發汗倘有作嘔宜少服 製法形色氣味已詳上文吐藥篇內矣茲特論 此藥服少許輒能作問發表每服二 三釐每兩

服功法用 其發表之用

一釐倘欲發表而不作悶須

將此藥一釐和清水一両分六次或八次服每兩點鐘 能作問發表每服坐釐至一

以上二藥凡傷風及熱症炎症初起者均宜服 服服後亦宜飲熱水及擁被以助發汗

松脂入藥則或用其膠或用其木均妙

樹產西印度海島高約三五丈樹有汁液外流狀若

圭厄禁



九 又 圭厄禁木八錢 方 圭厄禁膠四歲 每服五分至一 方發表 油四滴每服一酒杯 和勻衝次加入清水以共得二十安士為度再加入 腹覺略媛口略乾擁被助之卽能發表 同煎以煎去水三分之一為度分數次一 同上 功用主治同 为 一錢甚效 白塘回錢 清水四両 白樹膠粉二錢 日服盡 服後

薄荷 方劑 沙沙法 功用 根皮有油均入藥用 沙沙法樹皮四錢 圭厄禁膠不拘 可爲解毒去熱之通用下之根皮 發表行血最為上品該處土人春月采取此根皮代茶 此膠合鉱養水可作嫌 此藥產歐洲美國中國等處采葉人 用樹皮油每服二三滴樹膠水開服 此樹產美國高丈餘徑八寸 一一 發表門 發表解熱 氣味 和白糖製丸每服一分半至五分 清水八両 甘芳嗅之香烈 沙沙法 薄荷 或取嫌入藥作九亦可 煎作茶飲 功力首在樹根皮樹 、薬用葉画有油宜

去而無用 小心晒乾倘晒之不細則油將洩 氣味

辛温略苦

發表止悶祛風及治肚痛

方劑

製法氣味詳上交第卷 篇利小便門內

兼能發表解熱

甜硝伊打酒

薄荷葉二錢


清水八両

煎服

熱水汽發表之善法 每服二十滴至三十滴加水調服每 病人 、將衣服卸去坐於透氣椅 雨點鐘服

| 西藥 零二 發表門 超彈的 | | | | | 之法也 | 煨紅石卵投諸水中使水之熱氣騰蒸自可發表此誠捷項以下用衾圍覆將熱水一大盤置於椅下水若稍冷麵 |
|---------------|--|--|--|--|-----|---|
|---------------|--|--|--|--|-----|---|

土井フノ



化痰論

身體虛弱則只須補腦潤肺亦自津生而叛除 旋止 發於而致血帶則津液將輛止而不生即間或發多亦旋發而 夫肺經之疾缺則合生溢則合去卽屬化疾之法也顧肺內皮 則津枯便秘而此時無庸服也惟發表清熱而津自生 患炎症此則疾多而稠須服藥而使其多生津液庶幾流利易 多生而炎始退也 一起卽屬重症宜先服吐瀉等藥而後服化痰劑庶合津液 大抵在輕症則未幾津液復多而肺內及之炎自散 蓋化痰之藥不外合津液流行 惟肺內皮久 若身熱 抑或

出

化痰論

由内服

由吸此藥氣

成橫直一條形狀恍如曲尺惟曲尺之內則並有一小玻條相 合其透進肺內,而達於愚處 其吸藥氣之法先用小玻管製 末則另以一膠喉套人而膠喉並有兩顆鼓風之毬於是將該 是復用一球樽內貯藥水其直管則插入藥水之內其橫管之 連蓋取轉彎之際而彼此管口要離少許方得互相通氣也由 如此則自可透進肺內而療其各症也 越遊風而合直管內之藥氣上升卽吹其氣而送入病者之口 以膽禁水銀淡養水銀磺養水為最宣 與氣管有症或肺內皮發炎或久思吸咳或口不能言皆可療 第田氣帳所吸之藥俱略帶農故熱症乍起者宣先服別 若論藥水之品則當 况吸此藥氣者或喉

蠢等藥 脈去熱総肺內皮略有炎症亦可服也 西藥畧釋 稠為稀 即人咳氣喘者服此亦驗 其用吐劑化痰者如缬錦蘭吐藥及喉嗶啪之類是此蓋能不 有數品而究之該藥亦非人肺惟合肺經發力而痰自行耳 沸水之氣入肺亦能化痰醫者概宜知也 品而後用斯法方驗 拜把等藥 阿魏辛玄加及金雞衲霜等藥是此蓋能旺腦潤肺而行痰也 若痰少而咳極其,艱辛又宜服蒜頭阿魏及亞麼匿 間或痰多而有膿則宜服亞麼匿安息香把嗎油唱 抑或痰多而無膿則宜服辛衣加土圭釐及趕磺 12 且用斯法者或一時藥水赤便而只用 化痰論 他如用輕淡炭藿者亦能合痰化 其用補劑化痰者如 若夫內服之藥原

肺有膿穴而吐出之痰往往蘊膿在內此則殊非易治者也 化痰等劑忌服利大小便藥誠以其均礙夫化痰也 冷媛中度次則或服吐藥或服甘菊花水或飲媛茶均合凡服 助肺生力而送痰外出 且化痰方劑分二種 至若助其化痰之法宜先合身體 發悶而合肺之內皮生痰 惟为傷

甜後覺辣 功力在根之皮而根之心則無用也 根之色灰而黃根之身則有 化痰利水補胃服後能合脈緩而蓄力且能合臟 辛衣加 提取 化痰門 亲加 用水或火酒浸泡均能提出其功力 改凸起並 **圭**釐 氣味 草產於北亞 有浮凸網皮 美利加狀似 樂取根用

此

嘗試先覺

力而生液 利 若肺炎已退並無身熱而祗有假喘及覺軟

弱服此則能止咳而補

吐寫凡肺及各經有炎症者均忌服 用以作散每次服一分至二分

不宜過服過服卽致

作藥水方

辛衣加根沿錢

甘草根八錢

清水十四

同浸

用火煎沸煎至脂有九両六錢為度每服八錢日服三 小兒嗷症 一安上分三次服 人咳痰結難出宜

形色氣味已詳上利小便篇內茲並其化痰之功用

淡炭養同服

令疾稀多容易吐出

凡用以化痰每次宜服二三釐每日二三服若過服而 二分則作吐 凡久咳肺內皮有炎則無論痰之多

方劑 宜遗服侯炎退方可服也 寡均宜服之或偕别藥同服亦妙

惟肺經當炎盛時不

士圭釐宝両二 製藥水方此西國最通行之品也 辛衣加三ആ **欽娣葡吐散七分**

先將士圭釐辛衣加二味用淡火酒八両浸一 白糖三十二 淡火酒足用

置漏斗中濾隔再加入淡水酒以濾得共有三十六丙為 化痰門 主叠 阿魏

一點鐘然後

度取出入鐺用慢火熬去三分之二其餘則加以沸水四

両八錢再濾隔加白糖同煎至沸隨即取起再隔乘熱即

蓋照此分両製成每藥水一両約有飯錦蘭吐散二釐也 將級錦蘭吐散加入並冲沸水以合共有三十六両為度

五六歲者每次宜服三十滴至六十滴 小兒傷風吸喘服少許自可化痰 若用以取吐其在

肚年用以化痰

每服二三十滴

阿魏

廣州亦有之其樹最高者則有九尺而樹身徑約寸半樹上有 此藥乃取樹根之汁製成者也該樹原產波斯等處今

花而樹下之根徑約三寸其根並能發出大葉每葉長約一



形色 方劑 阿魏九方 阿魏二錢 鐘一服若小兒則減半 則變紅追後則轉黃黑 阿魏 入乳体內漸加清水研与合其出味每服 色或黃或紅或白彼藥肆所售者新打破則色白少頃 服法 錢両 治婦人 止咳化痰 、便結月經少者服之宜 清水八安 四錢 每服宜用五釐至分半每三四點 氣味 凡有咳症無論重要均宜服老 其臭頗烈其味苦辛 兩酒

又 阿魏酒方 阿魏四藏 阿魏 和勻作九二百四十粒每服一 變爲自色恍同牛奶 約重五釐每服 同浸十餘日爐隔每服五分至一錢此酒若加入 阿魏酒高十 化疾治假喘 療喉喘 鴉囉 淡火酒一斤 鴉片酒二十 一粒至五粒 化疾門阿魏 番鰊 一粒至四粒 恭頭 三者同重和勻 甜硝伊打酒 油

樟腦水二錢 共和匀作一服

方論

腦補肺則自可推痰外出 見皆可服能補腦去風利大便 蓋此藥功用猶之桂拏磺養雖本非化痰之品然能補 腹有氣臌胃不消化大人小 若婦人身弱血少而致

胃不消化氣緊肚痛等症服此最驗 且腹內脹滯大小

腸有風宜用阿魏水或酒射入糞門自可祛風消機

該仁內有油日人則洩 各國均有 形色 暑似恋頭外有衣而內有數仁風 藥性熱而味辛若搗針鈴在废

蒜頭

此物弗宜過食過食則悶而或致吐瀉

上則立發紅而有微痛

化痰開胃

功用 考訂 服法 匹米思 氣味 蒜頭與搗爛 服一 身熱時亦是食候熱退食之方見功效 入白糖一斤生煙熱合糖易化小孩每服牛酒杯老者每 化痰平腦然或過服則作悶而合頭昏目眩 至本草謂其並能解毒滅未必然也 身有熱症未可遽服 味苦辛而略澀且别具一種氣息 一酒杯 該樹產美國高約三尺或七尺入藥則取其根 止咳 白醋十二两 化疾門 吃蕾 惊医愚 和勻浸數點鐘爐淨再加 筋 微 抽

名二

薬水方 止咳

匹米思根追爛 茶杯均可 或取此根研幼作散每服二

阿麼匿

亦同上

清水十二

煎沸爐淨每服半茶杯或

一分至三分功

邁等處亦有是藥蓋由波斯採買者也

均有漿如牛奶時或為蟲醬破則流漿而結成此物茲孟

處高約五六尺幹頭近土處徑約三十許而樹身與枝葉

此藥乃樹漿結成者也該樹原產波斯印度中國等

紅黃剖開則自用手捆之將見慚軟如蠟若用水和一 初結成者不過小粒厥後互相交粘則或凝爲

服法 氣味 西藥男程 方劑 阿麼馬 退清亦不宜遽服也 腹痛亦不宜久服久服則滯而胃不消化 同牛乳 杯或兩酒杯 苦而辣别具 每次服一分半至五分惟不宜過服過服則寫 化疾行血彼咳症痰多而稠者服此最驗 薬水方 用阿麼匿和白醋煮至成膏外塗皮上能合發紅而 錢 清水四歲 種氣息 化痰門 蒼香 同研与用布滬淨每服 若熱症猶 而或致 酒

安息香 起小粒且服此膏能療風徑骨敛發腫等症 出處 此樹產於海南波斯及暹羅等處 一徑約

形架色製 尺生採此人 (藥則有一

將樹皮砍破令聚流出而結爲珠此則色略自

將樹枝砍碎熬廖滬淨後凝為

團色棕黑二者均堪

取

用

氣味 若藥肆所售者類多溷雜宜擇用之 研幼作散嗅之即令嚏噴其臭香其味始覺甜

酒能化而佛水不能全化若將鐵板煙熱以此

辣

西藥思釋 水能化少許輕淡水易化而輕淡化得之水加入輕綠酸 在板上將見白烟上升而並有安息酸味 升至盂間或略存少許此安息雜質通行者尠無庸詳 略多則作片珠如毛人曲玻管乾殿能變流質煅久可甑 乃輕炭輕養也色白作片珠而薄質輕臭香入口甘辛沸 附安息酸論略 口內合其透進肺部 入爐內俟藥烟上騰卽合咳者納烟入口 化痰行血 老人久患咳症即以酒化安息香而用法將藥氣吹入 蓋安息酸者係由安息香提製而成質 化痰門 蓋膏 法用炭火一爐隨將安息香放 又法用洲水

服法 全化也 內 已上各法均能療治咳症 外治惡瘡宜用酒開烧 每用一分須加入硼砂一分华方能令水化清否則不能 **鸎郎將安息香放八瞾裏俟藥氣上升令咳者吸入口** 或用安息酒及甘油調勻塗之均妙 凡服安息香及安息酸每服一分至五分 惟安息酸

惡氣邪病鬼胎霍亂風痛男子腎虛遺精婦人血噤及產 後血量等症服此皆能療治 時珍本草云安息香一物味苦辛而無毒几一切心腹 但據本草所論此藥功用

雖未必盡然而要未嘗無所取也

溶化 形色 西藥學釋 或細、 質在內色黑不過光而香味亦少 光若研末則黃白 有芒荆歲入者並有脂液流滴地下凝結成塊其塊或鉅 化以火酒則頗清若加入水則變白 水及餡養水亦能化 四分及清水一両六錢和勻方能化藍點看也或用虾養 此樹產亞利卑了亞非利加及波斯等國樹高數尺 藥肆所售者不 用清水火酒或伊打酒只能熔化少許 化痰門沒藥 上等者色紅黃或紅棕質頗脆略過 氣味 形化色後 味苦臭香 大抵化以水則白如牛乳 下等者則有雜 惟用輕淡綠

雖未必盡然而要未嘗無所取也

服法 方劑 症未可遽服也 沒藥末四錢 爲度 漏斗中再用火酒加入 漱口甚妙 藥酒方 胃不消化腹內有風及大便結者均宜服 化痰行血開胃並治久咳 去痰止咳每服一分至四分 補胃利大便 主治 **1** 用沒藥等研末先以外酒少許潤之然後置 大黃末八錢 牙肉浮腫用此藥酒 外治毒瘡用此作膏藥貼之亦可愈 八以滬得之酒共有三十二安土量 鴉縣木六錢 一錢清水六安 惟身 薄荷

私倡漿 用主法治 形色 西藥界釋 有汁漿外流取漿外藥用 商和勻作九二百四十七年服二三粒日服二次 此藥氣入口令其透進肺內而吃自可愈 身有熱症俟熱退方可服也 苦辣鵝同糖水氣息頗香 凡久吃將秘魯淡滴入火爐俟白煙一起卽着病者吸 每服十 简至三十 涸用水化加 白糖雞蛋白和服 此蓋化療之補劑也能療假吃氣促內傷 紅棕用火燃之卽起白煙 此樹產亞美利駕南北之間樹高數丈用斧砍之即 化 痰門 發雪頭 到電影 又旣生蘿蔔

いいとはれます

ナノルエーフ

之後,整營廳衙一每至冬今土養远處仍有發癢即用此凝

搽之可止

方劑

私魯銀二銭 豬油八錢

到魯泉

久患瘡疥等症而難收口者用此途之甚驗

和匀作膏

此樹亦產亞美利駕南北之間而採其漿以作藥功

同秘魯撰紫鷺。其在鲜者原屬流質若經人則乾若松香也 此漿乃化痰良劑每服一分半至四分用水化加白糖

自和服

方劑 到魯漿二两

人 西 三 十 二 同浸此酒鹽香

把鳴油 施於病者寢室蓋並欲辟除病氣而大有妙用也 彼久是暇症者嗅此藥氣自可化痰止咳西醫每以此法 把鴨油 症詳見下文 鍋盛水隨將該坏置於鍋內下用慢火煎之 用 始用每日只完 主治 稠而黑 此蓋由燃燒松木而用法以取其油者也 只宜藍二三次俟病者漸嗅漸熟方可常用 暇症 両 功用 化痰門 握獨 化痰行血 和与放入小杯次用

到一年日光八四日收成

依嗶格 功用 上面之水倒出再復煎至稠結然後取以製作藥係每條 此喜多製自呂宋亦通行之品也 長約五寸徑約六分色黑味甜冬則硬而脆夏則軟而爛 和水煎湖煎至藥味盡行發出為度俟冷該滓墜底卽將 其味甜甘 潤肺化痰 作甘草膏法 該根或大或小大者徑約八分外棕內黃 此樹中國歐洲皆有植焉高約四尺採根作藥 此藥功用並能化痰已詳上吐藥篇 えニー 服法 用此根擇其鮮者洗淨晒至半乾切碎 或級片或研末均可

甘草水製法 味甘乃甘草原味咳嗽可用或調和苦藥水亦可 士加八酒一安士俟十二點鐘再隔以絨布貯樽內此水 以探輕重表探之水一甘草水一零一六每甘草水七安 水四十安侵渣六點鐘隔榨淨盡將兩次甘草水煎溯至 **每服一安至兩安** 十安士侵甘草末十二點鐘隔淨搾盡渣內之汁叉用清 一百一十二度之熱絨布遍淨用隔水鍋煎去水汽略稠 暇咳痰多喉乾口熱均宜用此人口含嚥 胡麻子姓錢 粗甘草末一 化痰門 級獨監 潤肺止咳化痰 甘草杵。錢 清水八十安 佛水一斤 先用情水四 浸半點鐘

山上を名名はよりによりフィットス

一人光二

考訂 入口及用以交粘各種藥散令易寫九而已 但甘草一物除潤肺化痰外其餘則用以和別藥令易 至時珍木

草誇其能治臟腑寒熱堅筋骨長肌肉通九竅利百脈盆

精養氣定魄安魂寮瘡痘冶驚癇能和百藥能解諸毒竊

恐未必有此大用也

欽錦蘭吐散 製法功用已詳上交吐藥篇

化痰發表

白糖五分

和匀作十包每兩

黑

方劑

鐘服一包 鉄錦南吐散一釐

藥酒方

又 四藥界釋 欽錦衛吐散一釐 安土量調勻 和勻每服一錢每一點鐘或兩點鐘 鉄銷衛吐散七釐 鉄銷蘭吐散五分 鉄錦蘭吐散二釐 氣喘無痰服此甚效 治傷風初起乾咳者宜服 調勻每服一小酒杯 化痰甚效 大人用 化痰門 **藝次系一名** 沸水士量 麼明磺養一釐 沸水十三安 和化後加入車厘 和化後加入 清水四安 服、

樂酒方

淡磺產也由是再加翰綠鹽生煎熟則見其一變為輕淡綠 變爲齒磺養然此猶未淨也用鐵釜再將此二者同煎將見聽 通 輻然 哥拜把 淡綠卽行升上用法收取其氣而自離去館磺養矣 來卽將製煤氣所賸之水加入磺强酸和勻如此卽成爲醒 然和 麼明磺養一釐 昔日多用駱駝之糞燃燒其中卽有硇砂此特舊法其 功用化痰已詳上交利小便篇查閱便知 和勻每服一錢每兩三點鐘 此物出於火山卽生煤處亦有之 到層糖水士量 軽淡水五錢 清水一安 清水安七十

煎時不住手攪勻煎至稠結成粗粒爲度若隔淨後俟其冷凝 先將轉淡綠搗爛入磁鍋內再以清水放入煙熱化净然後加 一輕淡水再煙熱一刻之久乘熱隔淨後仍用磁鍋煎乾水汽 冷若甑之可合化盡無餘滓 皮發炎或傷風咳熱退痰少或久咳痰結或痰內有膿服 農淡各有妙處農者使痰不作淡者化痰易出凡肺內 火酒冷水均能化而熱水化之尤易化時則能令水略 城而涼無臭殊不可口熱即有輕淡氣發出 此物白而韌半過光剖開則其紋多直 化疾門 轄族縣

極淨製法一輕淡滴安士 輕沙外

個力安は

方劑 淡轞淡綠水方 轄淡綠 轄淡綠 消炎腫等患 發大水臌症由肝壤而致者白濁白帶喉痛久思喂咳外 肺內皮積血肺久患熱症皆效 此合痰化多而稀故易出也 入病者之口透入肺內可化痰止咳 濃轄淡綠水方 名二 小腸內皮與肺內皮積血及肺久患熱症 錢 療暇症使疾易出 清水士量 清水士量安 療吸咳使痰不作 喉痛用之嗽口亦佳 和化服之 用法吹藥氣 吐 血, 肝

叉 華淡綠二錢 清が八上量 華淡綠一錢 輻淡綠二錢 樹膠水一安 八口內甚效 治同上若病者或有作嘔則除去級錦蘭吐散可也 治久咳 治久患暇咳 治風溼跌打骨鉸腫熱或腎子發熱 火 酒 雨 安 甘草膏三錢 甘草膏二錢 和勻每服五分每兩三點鐘一 化痰門 和勻每三四點鐘服一錢 以此藥置鐵板上炙合化氣而吸 輕級 清水兩安 到魯殿和糖水三安 欽錦南吐散三釐 服、

南丁ンツイ

一先二

和勻用作藥酒以布徑透敷患處頻頻換之

方 輕淡綠五安

合水變給如雪可消炎腫

置患處可退炎消腫不致成膿 凡一切發炎初起患處未發膿者用豬小肚盛貯此藥水 **火**稍 量 研 未

冷水十六安

和、匀、

和匀每服一 白濁白帯 両毎兩三點鐘一 服.

輕淡綠五分錢

輕綠酸水高十

清水十六安

方

吐血肝發大水蠱症由肝壞而致者均效

清水工量安 以水節射入前陰


和化用

| 西 | | | 又 |
|------|--|--|---------|
| 西藥畧釋 | | | 又 方 塗養癬 |
| 化夾門 | | The state of the s | 豬油牛一両 |
| ₹ | | | 和匀 |

籍淡綠牛

は明水土里

和化用



斂藥論

内皮之延龍皆獨 能入血又在腦筋而發力也若外用者只在患處發力而與內 則合其入胃入膀胱入大小腸而在患症之處發力而且該藥 收東散海點震 生澀之果能合唇舌俱縮而略乾也 微絲血管收縮肉筋束力各腑之蛋白液質化稠者卽謂之紋 藥蓋藥力或發於腦氣筋或發於脈管而當其斂時則有如啖 夫症有宜於散者尤有宜於斂者此斂藥所由重也大抵能令 醫者宜悉察也 **斂潰疽之膿** 且斂藥亦分內外內服者 斂藥功用有四 一止血流覺聲症

西藥暑釋

敏薬論

服有别宜分晰焉

顧用藥一道尤貴精益求精如用銀淡養

內服 水愈冷則愈佳誠以微絲血管經冷即可收縮而閉也養嚴嚴 者如鉛霜冰雪等類是也惟屬炎症熱症須先去清炎熱方可 有兼補虚弱者如炭匿酸鐵綠酒及鐵鹽是也且有兼去內熱 養酸等藥以止血流亦更勝於炭匿酸之類也况同是斂劑而 **劑則更勝於植物之類也如外用幾阿蘇銀淡養及磺養酸淡** 皮等藥以數未遣毒瘡則更勝於金類也如內服金類以作飲 及銅磺養以塗瘡疥等症則更勝於炭匿酸之類也如用槲樹 他如細小脈管割傷又當以冷水浸淋爲最妙之法蓋

先一

西藥署釋一人公二 要巴兒些 主治 要巴兒些葉八錢 足十六安士水爲度如不足以清水加足每服八錢每日 要巴兒些葉研末八釐半至 服之可收縮各處內皮微絲血管故炎腫痛可漸止也 小便色黑氣臭迥別無可比擬 几內腎膀胱溺管三處內皮發炎等症以致尿急難忍 小服各别大服發嘔作寫小服開胃止滑瀉 治同上 砂淋內痛服此可減肺內皮發炎下痢流白帶均效 出產圖狀已詳卷一第 飲牆門 沸水十六安 要巴見些沒多 開水服 煎一刻之久處淨要 服此藥

没石子

没本日 子石



石子者則殆產於

也盖推原

没石子

均有生焉而惟出此 該樹原有數種 、樹枝而結成 此物 由蟲

布卵厥後 或化蟲而去或仍在枝裏所以該木因之成癭面結 今中華亦有是

、泰西但該樹

学

爲得力

功用 方剪 酸者結成是物方堪入藥其在下等者穴大而穿透其在上等 者物內小蟲尚未透出極佳者該物每百分則函有炭匿酸六 沒石子分研末 沒石子四錢 驗 能飲功同炭医酸惟少人服劑耳 此物小者如荳大者如胡桃質硬而脆 外用作藥膏方 治喉症 沸水五两 **猪油八錢** 泡之用以減喉亦妙 和勻用搽潰痯及 氣味

此霜卽炭匿酸也

(六二

天獨浸畢隨倒入麻布袋裏用法壓之分酒洩出其澳曲 先將沒石子研末俟兩三日合其發潮而後用伊打酒

復用伊打酒一 之酒另用 瓶存貯由是取出藥滓再行研幼然後放風袋中 十五清水一和匀淋入袋内仍照前壓之候出

於是將前後壓出之酒調勻少頃侯上面之酒飛去監響原

墜底者卽炭匿酸也由是再用慢火煎乾便可製成此藥 色略黃而體輕鬆

濇而斂入 伊打酒能化少許惟水與淡火酒方能溶化 口能合舌縮

用主治 功用 與人身相宜惟過服則未免大便結耳 炭匿酸為最妙之 飲藥味不甚苦亦無臭入胃不吐 ぬ 凡流血吐血

作做劑宜服三釐至八釐每日三四服

四釐 此藥和鴉片同服 老人久咳痰多每服二釐至四釐可治 月經過度及肺經內腎出血均宜服每服四釐至八釐 合淡硝强水十滴冲水服甚效 內傷盜汗及患白帶等症宜以此藥

釐清水八錢調化搽之小兒眼炎有膿者外滴亦住 婦若乳頭痛爛宜用炭医酸八釐清水一安和勻搽之 牙齦出血或痔瘡流血宜用藥水敞洗或研幼未變之

眼科用炭蓝酸五

人思痢症宜以

作薬水方 作藥膏方 炭医酸八錢 炭匿酸四分 蜡七分 瘡邊肉芽浮凸宜用藥水或藥膏敷塗 化盡為度搽之 取出卽分作十二粒每粒須製成筍子樣由是再用豬油 療痔症及嗾內浮腫老人糞門腎囊等<u>處發養等</u>患 **痔漏脫肛局血及紅白痢等症** 炭匿酸 炭匿酸八分分 入鍋煙熔俟冷隨將炭匿酸甘油加入 元二 甘油四安 甘油滴十 四釐 清水一两 豬油 調勻 研与人磁鍋內厚熱至 一両或 調化作 次將豬油 和匀塗さ 三 併和勻

紙提乾其所賸之水另以一瓶存貯由是再用水十五安同煎 露天氣四十天陸續加人清水待過四十天後再加水四十五 同煎約煎二十咪呢之久隨用布濾隔俟冷凝珠旋即取出 沒石子研末用水調勻備足調至稠結如漿為度但須 炭匿酸 條插入糞門俟其鎔化入血自可療治 然後取出俟冷凝結隨用玻瓶貯密 白蠟 凡牙痛有腐穴以綿蘸此藥油塞入牙穴甚效 、鍋煎鎔帥將此藥一 麼啡三毫 基澳蘇 一投入今其復染油蝦 凡遇前症以此藥 和勻

燉牆門

架河酸

煎至該珠化盡方可停火停火後俟水冷至寒暑表八十分則 和勻同煎煎至尚存十安士為度俟冷凝珠將珠取出亦宜做 入清水四十五煎沸隨用布將水隔出而與前所賸之水合共 焆乾以賽羹整二百如此的成為架沙酸也 必再復凝珠而所騰之水亦貯起其珠則另用至冷之水土量 照前法製成然後 函之炭匿酸而即變爲架洲酸是誠斂藥中之上品者也 之素片分震濯星將珠取起先以紙提去涇氣而復用慢火之蒙於臺墨翠濯星將珠取起先以紙提去涇氣而復用慢火 凝珠頗幼髮髯似針色白或略黃 一併貯入玻樽 已上製法蓋令沒石子所 至所賸藥浑宜再加

略酸而且澀

冷水一百倍方能化

卽能化 伊 打酒化少許惟八酒始能溶化

飲藥上品及可止血但多作內服甚少外 婦人月經過度每服此藥一分半每兩點鐘或

佳奴 甚至或吐血或嘔血或久病而致鼻内流血及大小腸出 二四點鐘 服

若內腎有壞或出血或小便似有蛋

割其皮卽有汁液外流此藥蓋取其液製焙而成殆與見 血等症宜服此藥八釐至三分每日三 此樹產印度南亞美利駕及亞非利加等 四服旗

虚樹高而大

質脆厥色棕黑若以水及火酒浸之立轉紅色 飲牆門

形色

茶同類也

方劑 功用 見茶 木熬水煎煉至稠然後或攤属上或置器上用以晒成者也其 在上等者每百分則面有炭匿酸五十四分 住奴二歲 佳奴末五錢 和 無臭其味苦澀 与作散入樽貯密 極鐵能止洩瀉誠以此物面有炭匿酸也 作藥水方 該樹產緬甸印度及西印度等處若見茶一物乃取此 入患紅白痢症及內傷已久而至發汙疴痢者均效 一両 沸水六两 鴉片末一錢 毎服宜服一 浸濾毎服 桂皮末四錢 分半至三分 酒杯或兩酒 杯

用主法治 方劑 形色 兒茶末一錢 茶一粒含化可愈 血用此藥水院之或慘以藥末亦妙 同浸半點鐘滬淨每服八錢至一両六錢 見茶二歲半 藥水方 婦人患白帶用此藥水射入陰戸 能敏恍同佳奴 和勻敷膿瘡等症竒效 **褚油八錢** 桂皮末五分 敏牆門 服法 **注葉** 每服宜用三五分 湖水八両 若痔流血及鼻流 牙肉浮腫宜取兒

該樹高約二三丈其幹多曲其枝有簕蓋產於西印

度及亞美利駕南北之間也

用以充顏料也 入藥則砍其木心而以水泡之 若砍碎其木而浸以水及火酒則呈色甚紅故染家亦

功用 帶內服及用藥水節射入陰門 服法 能飲日人痢症服之能治身熱未可遽服

方劑 洋蘇木碎八錢 作藥水方 治同上 清水一斤

桂皮末一錢

先將清水煎蘇木一刻次下桂皮末和勻然後爐淨每服 一両六錢

The state of the state of



作藥膏方

煎乾則所賸者卽藥膏也其色黑其質脆每服一 四分 洋蘇木碎一一 沸水六斤 同浸浸畢瀘隔隨將該水

方論

架美喇

者也惟服後則糞色多屬黑耳 蓋此藥雖稍遜於住奴等物而要爲斂藥中之不可少 此樹產南亞美利駕及西印度等處樹高數尺取根

該根色紅棕 氣味

形色

へ薬

冷水沸水及火酒均能提出其功用 敏滴門 架美喇 樹瘦 無臭其味苦濇 长

槲樹皮 尚粗仍須 到去 方堪取用 用主法治 功用 宜將此藥浸水洗之 煎一刻瀘隔但須加回清水以仍得一斤為度 浮腫及喉有症宜用此藥水漱口 陰戸基驗 略棕 補而敏功同住奴 凡肌肉有紅腫宜將此藥搗爛外敷 能斂多作外用 該樹高而大各國均有 用此樹皮追爛 、藥取其樹皮但皮之 白帶用此藥水射 清水 F 牙肉 回

功用 方劑 金星即路養 和勻用慢火煙至熔化濾淨再復煎乾至上面起有一 石幅樹皮 西紫恩澤 上品也餘則詳下殺蟲篇內 懸鈎子根指順向 **醋强酸四十安** 補斂 此樹產中國人 此樹隨處俱有而功力全在樹根之皮用作 治久患痢症 勉 海門 縣的子 石榴樹皮 船和 清水 蜜陀僧未安士科 八藥取其根用 一斤 同煎 刻毎服 清水二十安 酒杯甚 層白綿

形色 一一一いい!!! 功用 溶化 用紙提去水溼方可貯入玻樽 爲度其或倘無酸味則再加些醋强酸可也俟冷凝珠取出復 胜湖 氣味 方劑 鼻蚵等症服之皆可療治 不能化盡而水成白色也 珠色白露天氣則略化為散 能斂並能止血 味甘臭同白醋 凡一 火酒能溶清水四倍亦能化一 切肺經吐血大腸便血內腎流血月經過多與 光光二 治痢症 若水內面有炭匿酸即

西藥界釋 鉛霜五釐 釐以漸加多早晚各一服 即以水節納此藥水射入每日數次甚效 疼痛及皮膚紅腫等症宜用此藥水洗之或用布蘸此藥 小兒每服半釐至一釐每日七八服 水敷之均妙 八咳痰多宜服鉛霜鴉片散二三釐每日五六服 亦妙 毎服五釐毎日四五服奇效症後或局痢或氣臌服之 鉛霜一分 鴉片一釐 白濁白帶宜用鉛霜二釐兩水 清水一両 做牆門 鉛霜 研和 鉛養醋水 和化凡遇跌打損傷骨鈴 内傷盜汗每服七 眼熱有膿 两和匀

濾淨 忌用 和勻約煎牛點鐘但須加回清水以仍得二十安士為度然後 公霜五岁土 此藥忌多服及人服否則或成軟鉛之症 藥即見功效 宜用鉛霜研幼即翻胞皮向外撒之俟胞皮自然之液化 眼明角單有瘡忌用此藥蓋鉛食潰處將必作點也 二釐或雨水一両調化滴入 タイ 鉛養三箇半 此藥水清而無色 清水二十安 氣味 眼胞内皮若起炎粒 甜而略

白礬 用主法治 溶化 功用 妙 洗之或用布蘸此藥水敷之甚驗水調勻無使過濃 眼熱症或流水或出膿將下方藥或洗或敷 毎服一 斂血斂汗、 凡跌打損傷皮膚紅腫及患膿瘡等症宜用此藥水以 此物沸水能化火煅可熔若久煅之則成枯礬 可作斂劑 形色氣味已詳上吐藥篇 鉛養醋水庫量 分半至三分用水化服或研幼末和糖水服亦 清水十九安 自磐 酒麻量地 和勻

方劑 9 4二 止血效血凡肺胃或大小腸內腎等處出血

皆效

白礬末二錢 牛乳十二 白糖八錢

每服白礬末一分半至每日四五服可療上諸症 和勻煎沸滬淨每服 一茶杯

鉛

用主

症腹痛用白礬末生 每次加鴉片酒八滴同服亦作 凡久痢用白礬末一分清水調服每四點鐘 分每雨點鐘 嘔疾嘔水用白礬末分 一服服至作瀉爲止或

和糖薑汁服每日服三四次外用白礬末 娇 人月經過多用白礬末

半和糖水服每日服三次

次頗效 化射入陰戸 量士和与以水節射入甚驗 和勻用水節射入膀胱奇效 分雨次射入可愈 量士和勻晚間先用此藥水一半射入陰戸餘一半次朝 每日三服 分半至每日四五服 一錢或清水八岁和与射入糞門 錢沒藥酒四錢清水十二安和勻用以漱口每日數 喉熱痛爛用白礬末一錢清水五両 外用白礬末二錢鋁磺蠹二錢湖水 又用白礬木四銭炭医酸 膀胱發熱出血及出濁物用白礬末 外用白礬末生 痔漏流血及脫肛用白礬 婦人白幣用白祭末午 牙肉浮雕用日礬 半分清水上量安 二錢或清水十 - September -不同

功用 疑者忧似纖針。墨藤學皇清安一氣味 災養淡養。 攀末四分白藥膏四両調勻塗之 熱眼腫等症 滴入眼裏 末一整共研与作九六粒間兩點鐘服一粒 眼熱以白礬水洗之或以白礬末四釐至雨水一 能斂 一卷二 白濁用白礬末八釐清水一 形色 服法 叉用雞蛋白調白礬末以淨布裏敷能治眼 吐痰血以白礬末一分鴉片末二釐兒茶 尺嘔吐不止腹內作痛及久患痢症宜 此散色白覈以顯微鏡則見其質之所 無臭無味 両和勻射入溺管 痔瘡以自 一両開化

空心服此散一分至三分华或服至五六分亦可用擴水

西山東思維 金叶蓝 功用 服 生 治 館惡西鹽 點鐘 或粥水開服 宜用粥水或糖水調服 鉛霜二 **數並可解酸用以療治各症殆與絨養淡養無異也** 九胃不消化虛弱作嘔及至婦問吐 每股 形色 月艮、 一一一一一一 形色氣味未詳 建靖青二线 若在飲乳嬰兒每服三釐丟五釐每 氣味 此藥水所難化 無 以水化与即變為趕醋鹽及 溶化 水所難化 三四四

變為鉛碼霧原屬白散宜即濾去隨將該水煎乾則可成為絕 鹽地 醋鹽而無雜質也 西朝琴子水 形色 的 功用 方劑 同浸由是則酷强酸離去該鉛而與鍵相合亦即成為經費 眼熱用以洗之白濁射入溺管均效 水易化露天氣則變為白散 能斂多作外用甚餅內服 游片色白 卷二 又法 氣味 清水 とはいる ノー といっとかいっして メイト 八銭 先以水鎔化鉛霜次將趕質其點 無臭味澀 和约 但初思是

雖養 俟數日小便不甚覺痛方可用此法也 製法

取出隨將淡磺蓋緊之以

用鍟炭養入 形色 不見沸馬度貴以烈然經費金養氣 質輕而鬆純淨者多作自粉用火煙紅即變黃色俟 八五鍋腐至略紅養養

氣味 無臭無味 水與火酒不能化惟强水及飯養鰌養方能

後如無鐵質在內仍返白色

溶化

平腦可作斂劑 服法

每服三雄日三次道城後服員

置女抽搐服之能治 酒醉發顫頭昏目眩服此可止

用主法治

西樂是釋

1 Kara

放海門 鐘養 程喷動

薬官方 日本上子ア 散藥膏均可 銀養三鉄 **丙傷盜汗毎服** 損爛則或緣以散或搽以膏均妙 至若乳頭裂爛肛門腫爛及領上腋下髀裏等處 目眶熱燗宜用膏搽之 能療皮膚各症 で、左二 白藥膏八錢 大水螆顯天泡瘡如屬淺症者宜用散掺 分百日 兩股 建型發 和匀缝之 **磨邊紅爛塗以膏亦可愈** 外治則用作藥

インス・ナーー

銀磺養

製法形色詳上文吐藥篇內

止血內服外用均可

眼患以

三五 開清水 内傷盜汗開服

両溶化滴之每日早晚一次

杯毎日三服 以此藥一 中清水八錢和勻用法將此藥水吹出水花合病者由口 熱退後而用此滴入甚驗 射入尿管效 鉛霜七釐鴉片酒一錢清水四 吸入而透進肺內自可調治 **鋥磺蓋**一分 日久血廟以此藥三產甘菊花水丘錢和化服 治白濁 分至二分清水一 白濁以此藥四釐清水入貧開化用水節 喉內久炎及肺內皮舊炎痰多以此藥 樹膠末 勉潘門 细葉 両開化含軟可止塗瘡亦可 両和化能療大熱眼若經 滴眼除熱用此藥一 鴉片酒一錢 汽水 四錢

銅磺養 銀磺養三釐四 銅磺素四釐分 要之鉱薬不 製法形色功用已詳上文吐藥篇内 和化射入尿管 搽瘡用 滴眼藥水 等藥亦入敛劑此則另詳下文也 治婦人白帶以水節射入陰戸效 清水土量 牙龈腫喉爛用此藥水瀬口甚驗 清水一安 如幾阿蘇 毎日樣患處兩次 毎日早晚滴一 輕綠酸 磺養酸

蟲首尾俱尖而肚略大其肚間約二分蓋恒伏人之腹裏也 其三則有微細之蟲而每匿於數門之內蓋生是蟲者多屬小 西藥畧釋 之此則頭小腹大其腹闊約三分者也 **兒也** 已上三種皆宜細聚 中腹頗大而首尾俱小此則其腹闊約四分或恐分者也 足蟲也但此蟲復分二種 是蟲者小兒少而大人多其蟲身區而長節節分肺而恍如百 夫蟲生於胃及大小腸者有三種 一該蟲則長約四寸或一尺而蟲身又圓而非區者也 殺蟲論 一般 殺蟲論 一種長約五丈甚至十餘丈亦有 顧小蟲則用藥殺之自可悉除 其一四名顯尼亞大抵生 種長約丈餘亦惟 且該

岩

流行自可推之使出也 蓋該蟲每因腹內津液稠結伏而不出惟服以寫劑則令津液 若長蟲則雖療之以藥亦非易治 須再服鴻油庶合該蟲易出 年芝奴褒及亞必安土拜核喇石榴樹皮等類是也領服藥後 朝夕尚須用肉食培補方易全愈 辱弱或因飲食鄙劣而致生蟲者宜服此藥殺之得殺歸後而 種屬瀉藥如迦路米火石家粉及渣盆土金無尼等類是也 種藥力善能殺蟲如松節油山道 彼小兒或胃不消化或因身體 大抵殺蟲之劑分三種

は場合であるととう

西藥學釋 **夏**取 所植所有枝葉萬核均堪入藥 該核搗爛每服三分用糖水開調日服三次 用污取出者也。 彼小兒約三歲時類多生歸宜照此療法連服三天而後 蟲最爲上品 覈其。枝葉真核均面有油而功力即在是油也用以殺 菓核大如白萱 法用此鮮東連葉楊汁飲之每服 此樹產美國高約二尺五或四尺蓋自生於村落非 每服五滴至十滴亦宜日服三次和白糖服 殺 龍門 並好要 山道年 氣味 該葉氣息殊不堪與 清水十二 一酒杯 煎服 至用該油 又法將

再服瀉油可治



氣味

該遊用指挪之其香迥異

山道年 若山道年一藥乃取其花莊製成也

該樹產波斯埃及等國

殺鼠猛藥、 服法 凡患生蟲症大人每服五釐至 信

在此油霜一

功用 寫油立驗但此藥不宜多服否則腹痛作嘔河痢 所 分小 兒 三 不免用輕者宜慎也 四歲者每服一釐至五釐日服三次服畢再服

西藥暑釋 服主法治 氣味 功用 上拜枝喇 **邊**獲 源 淨 方合而別處鮮用 每服四両至八両日服二次連服三日甚驗 但功力派在新鮮時若乾則罔效故用是藥者惟在美國 若浸藥時再加入主拿菜四錢其功更峻並可略寫百 凡遇生蟲症用此根鬚拋爛 根之身復有鬚該鬚長約三五十色棕黃 功力即在根與鬚此在美國咸推為殺蟲最妙之藥也 平和味苦而略計 一个人 該樹產美國高約尺六而人藥則用其根 小兒二 二歲者每服此藥水四錢至八錢 沸水計二浸雨點鐘樓

方劑 亞必安 功用 服治 石福村皮 服服後如覺作問或嘔或寫方見應驗若猶未寫仍宜 服庶能獲效 用慢火煎沸以煎去該水一 股過服則將頭暈筋抽目眩眸子散大未免壞 則服此藥後宜再服瀉油方易奏效 凡大人遇生蟲症每服此藥水一茶杯每 全在樹根之皮八藥則取其乾者而用能殺腹內長蟲 此植物產歐洲美國 形色 用此根皮大錢清水十 略帶灰黃 / 藥則用其根、 半為度滬淨 氣味 **万先浸廿四點鐘次** 苦涩 但此藥亦不宜過 人宜慎 一點鐘 A COLUMN 再

西藥恩釋 方劑 版法 功用 氣味 色為度取出煎去該酒則所賸者恍然如油也 **每服十五滴至三十滴晚閒服** 斗 H 中略爲壓實然後將酒徐徐加入以加至不見根之綠 必安根為爛 能殺腹內扁節長蟲 每次宜服藥末一錢至一 根味略胡而苦澀 尺或三尺坐取根作藥自古而然晒乾研未厥色微綠 根長約尺許徑約寸餘且其根能生大葉該葉長約 製薬油法 殺蟲門 養子 伊打酒。全工作安士 三錢若服此藥 次次早服一次至次晚 三 先將根置漏 此藥油

功用 其樹皮 氣味 紫結實如小鈴生則青而熟則黃故又名金鈴子也人藥則用 再服寫油如此則該蟲自可殺也錢之多而始獲功效者 用此根八歲沸水二十岁同浸濾淨分四次服功效同上 殺蟲 該皮味苦寒而有微毒晒乾研未用 產中華印度及歐洲美國等處樹高三丈花色紅 服法 毎服三分 惟不宜過版過版則或

方劑

頭暈目眩及筋微抽愼用之可也

N 三年 無人名称 氣味 東也入藥則取其花晒乾而用 西藥界釋 哥蘇花四錢 為度 苦練樹皮二两 至作問嘔瀉為率如此便見功效 併服之或分兩次服亦可服後歷四點鐘久再服萞麻油 令瀉自 味苦而香 此樹高約丈五產阿比西尼亞國卽在亞非利加之 一可獲效、 彼小兒腹内生蟲宜服 沸水六两 功用 殺蟲門 事縣南縣 記德喇天 清水十六安 能殺腹內扁節長蟲 同浸約半點鐘取出連花 酒杯每三 同煎以煎去該水 一點鐘 服服

南瓜核 此瓜各國均有人 ライニー 八藥則用其核

功用 能殺腹內長蟲

南瓜核八錢去殼搥爛六

後則逾四點鐘再服蓖麻油可也 同服甚驗但未服之前須於

日内暫停

食養飧等物服

和白糖水或牛乳

頗紅人藥取其粉用 華等處所結之果大如萬荳而果殼則有粉色 記薇喇 此樹高約丈五產印度小呂宋及中 氣味 **函粉無臭無味**

水不能化沸水只化少許惟煎火酒

松飾迪 **西薬**暑釋 功用 先將松節油甘草末和勻後加人 清水和服每三點鐘

一服遮服五六次至瀉爲度 功力甚烈用以殺蟲在明度國最為通行者也 服後再服些瀉藥或蓖麻油更妙 松節油土量安 能殺腹内長歸 製法形色功用已詳上支利小便精 程量 甘草末一量安 服法 每服五分至三獎用粥水或 蜜糖雨安 八蜜糖每服一 サル 錢主四錢 此藥

Lastper シタニ H87374 1914 V2

